



FULMINANT 10

Insecticida - mosquicida

Forma farmacéutica

Granulado soluble.

Composición

Thiamethoxan 10 g
Z-9 Tricoseno, Bitrex y otros excipientes c.s.p 100 g



Indicaciones*

Indicado para combatir moscas sensibles o resistentes en todo tipo de instalaciones rurales, tambos, galpones avícolas, criaderos de cerdos, caballerizas, establos.

Posología*

Para aplicar como pintura: En el mismo recipiente colocar 400 g en 320 ml de agua. Agregar lentamente los 320 ml de agua tibia y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. Esta cantidad es suficiente para aplicar en un edificio de aproximadamente 160 m² de superficie cubierta o correspondiente a una superficie de pared/techo de 400 m² de superficie. Se recomienda aplicar en un mínimo de 30 puntos (de 10 x 30 cm), donde se congregan habitualmente las moscas, por ejemplo: Superficies calientes por el sol, postes, líneas de leche, exteriores de galpones, etc. Donde haya poca superficie para pintar o donde sería inaceptable una coloración de pintura, se utilizan tiras de cartulina o plástico, pintadas con Fulminant10 y colgarlas de los techos.

Para aplicar por aspersión: Utilizar una mochila o aspersor manual. Mezclar bien 400 g de Fulminant 10 con 3,3 litros de agua tibia. Esta suspensión es suficiente para asperjar un establo o edificio de 80 m² de superficie cubierta o de 200 m² de superficie pared/techo. Debe tratarse un 30 % (60 - 90 m²) de la superficie en paredes en que habitualmente se paran las moscas.

Contraindicaciones

Evitar el tratamiento en paredes sucias, muy porosas o recientemente encaladas.

Tiempo de espera*

El efecto residual que se obtiene es de 4 - 6 semanas.

Propiedades farmacológicas

Thiamethoxan tiene baja toxicidad aguda. Las intoxicaciones son solo imaginables si se ingieren grandes cantidades. En animales de estudio, los síntomas de intoxicación fueron inespecíficos y pasajeros. Acción tóxica: Interactúa con receptores nicotínicos de acetilcolina. No es inhibidor de la colinesterasa.

Producto de origen

Uruguay

Presentación

250 g / 400 g

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.