



Maxforce[®]
FORTE



GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

COMPOSICIÓN: Fipronil:.....0,05 g
sucrosa, aceite de soja, proteínas de avena, saborizante de pescado, syrup,
hidróxido de sodio, emulsificante, espesante, etanol, preservante, benzoato
denatínium, agua, c.s.p.:100 g

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO!
PELIGROSO!

Lote N°:

Fecha elaboración:

Vto:

Argentina

RNPUD N°: 0520085

Autorizado por SENASA: C-

Importador Bayer SA RNE: 020033212

Uruguay:

Reg. M.S.P. N°80861. Reg. I.M.M de S.P. N°

Contenido:
30 g



AR 84422274b 03/2017



Maxforce[®]
FORTE



GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

COMPOSICIÓN: Fipronil:.....0,05 g
sucrosa, aceite de soja, proteínas de avena, saborizante de pescado,
syrup, hidróxido de sodio, emulsificante, espesante, etanol,
preservante, benzoato denatínium, agua, c.s.p.:100 g

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO!
PELIGROSO!

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones
a tener en cuenta para evitar accidentes.

Argentina
RNPUD N°: 0520085
Autorizado por SENASA: C-
Importador Bayer SA RNE: 020033212
Uruguay:
Reg. M.S.P. N°80861
Reg. I.M.M de S.P. N°


Origen: Estados Unidos
No Inflamable

Argentina Bayer SA
Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD) -Munro Buenos Aires.
Tel: 080028222 (CUCA) 011-4762-7000
www.proteccionambiental.com.ar
email: saludambiental@bayercropscience.com

Uruguay: Bayer S.A.
Luis A. de Herrera 1248 WTC Torre III
Unidad 2074/2075
Tel.: (2)192 2300

Lote N°:
Fecha elaboración:
Vto:

Contenido:
5 estuches x 4 jeringas x 30 g



AR 844418996 03/2017



Maxforce[®]
FORTE



GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

PRECAUCIONES:
-CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL
-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
-No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios.
-No fumar, beber, ni comer durante la aplicación.
-No transportar ni almacenar con medicamentos, ni alimentos.
-No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o sus envases.
-No reutilizar este envase.
-Evitar el contacto con personas y animales con el gel aplicado
-Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales.
-No almacenar ni transportar junto a alimentos

ALMACENAMIENTO:
Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavarse profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión lavarse la boca con abundante agua. No provocar el vómito. Consultar inmediatamente al médico llevando consigo la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLOGICA Clase III
Nombre común: fipronil grupo químico: fenipirazoleos
Antídoto/tratamiento: tratamiento sintomático

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN
Capital Federal: Ctro Toxicológico de Hospital de Niños Tel (011) 4962-6666/2247 Bs. As. Ctro Nac. De Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo Tel (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-0160; Hospital de Niños La Plata Tel: (0221) 451-5555/0800-222-9911; Rosario: Centro Toxicológico TAS –Tel: (0341) 424-2727. 448-0077, At las 24 hs, Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel: (0351) 427-6200 int 4135. Uruguay: CIAT Hospital de clínicas 7° piso, Tel.: (02)1722.

GARANTÍA
Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



Maxforce[®]
FORTE



GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

COMPOSICIÓN: Fipronil:.....0,05 g
sucrosa, aceite de soja, proteínas de avena, saborizante de pescado,
syrup, hidróxido de sodio, emulsificante, espesante, etanol,
preservante, benzoato denatínium, agua, c.s.p.:100 g

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO!
PELIGROSO!

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones
a tener en cuenta para evitar accidentes.

Argentina
RNPUD N°: 0520085
Autorizado por SENASA: C-
Importador Bayer SA RNE: 020033212
Uruguay:
Reg. M.S.P. N°80861
Reg. I.M.M de S.P. N°


Origen: Estados Unidos
No Inflamable

Argentina Bayer SA
Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD) -Munro Buenos Aires.
Tel: 080028222 (CUCA) 011-4762-7000
www.proteccionambiental.com.ar
email: saludambiental@bayercropscience.com

Uruguay: Bayer S.A.
Luis A. de Herrera 1248 WTC Torre III
Unidad 2074/2075
Tel.: (2)192 2300

Lote N°:
Fecha elaboración:
Vto:

Contenido:
5 estuches x 4 jeringas x 30 g



AR 844418996 03/2017



PREVIENE AMARGANTE INGESTION HUMANA

GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

Maxforce

FORTE

BAYER

BAYER

Maxforce

FORTE

PREVIENE AMARGANTE INGESTION HUMANA

GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

PRECAUCIONES:
-CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.
-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
-No almacenar ni transportar junto a alimentos
-No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios.
-No fumar, beber, ni comer durante la aplicación.
-No transportar ni almacenar con medicamentos, ni alimentos.
-No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o sus envases.
-No reutilizar este envase.
-Evitar el contacto con personas y animales con el gel aplicado
-Solo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales.
ALMACENAMIENTO: Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavarse profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión lavarse la boca con abundante agua. No provocar el vómito. Consultar inmediatamente al médico llevando consigo la etiqueta.
CATEGORIA TOXICOLOGICA Clase III
Nombre común: fipronil grupo químico: fenipirazoles
Antídoto/tratamiento: tratamiento sintomático
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: **Capital Federal:** Ctro Toxicológico de Hospital de Niños Tel (011) 4962-6666/2247 Bs. As. Ctro Nac.de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo Tel (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-0160; Hospital de Niños La Plata Tel: (0221) 451-5555/ 0800-222-9911; **Rosario:** Centro Toxicológico TAS –Tel: (0341) 424-2727, 448-0077, At las 24 hs, **Córdoba:** Hospital de Urgencias, Tel: (0351) 427-6200 int 4135. **Uruguay:** CIAT Hospital de clínicas 7° piso. Tel.: (02)1722.
GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

BAYER

Maxforce

FORTE

PREVIENE AMARGANTE INGESTION HUMANA

GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

BAYER

Maxforce

FORTE

PREVIENE AMARGANTE INGESTION HUMANA

GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

BAYER

Maxforce

FORTE

PREVIENE AMARGANTE INGESTION HUMANA

GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

COMPOSICIÓN: Fipronil:.....0,05 g
sucrosa, aceite de soja, proteínas de avena, saborizante de pescado, syrup, hidróxido de sodio, emulsificante, espesante, etanol, preservante, benzoato denatinium, agua, c.s.p.:.....100 g

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

CUIDADO!
PELIGROSO!


Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

Argentina
RNPUD N°: 0520085
Autorizado por SENASA: C-
Importador Bayer SA RNE: 020033212
Uruguay:
Reg. M.S.P. N°80861, Reg. I.M.M de S.P. N°
Origen: Estados Unidos
No Inflamable

Contenido: 4 jeringas x 30 g

Lote N°:
Fecha elaboración:
Vto:

Argentina Bayer SA
Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD)
Munro, Buenos Aires.
Tel: 08002822 (CUCA) 011-4762-7000
www.proteccionambiental.com.ar
email: saludambiental@bayercropscience.com
Uruguay: Bayer S.A.
Luis A. de Herrera 1248 WTC Torre III
Unidad 2074/2075
Tel.: (2)192 2300



AR 84480134b 03/2017

BAYER

Maxforce

FORTE

PREVIENE AMARGANTE INGESTION HUMANA

GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS



Maxforce® FORTE



GEL PARA CONTROL DE CUCARACHAS

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR JUNTO A ALIMENTOS.
SOLO UTILIZAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS
Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.
CUIDADO! - PELIGROSO



GENERALIDADES: Maxforce® Forte es una formulación específica para el control de cucarachas. Desarrollada por Bayer S.A., ofrece innovación tecnológica en el desarrollo de geles para los profesionales en el control de plagas. Su especial formulación brinda simplicidad en la aplicación, asegurando una prolongada residualidad, poder de atracción y eficacia del producto.

INGREDIENTE ACTIVO: Maxforce® Forte contiene fipronil, un ingrediente activo perteneciente al grupo químico fenilpirazol, investigado y desarrollado por Bayer S.A.

COMPOSICION: Fipronil:	0,05 g
sucrosa, aceite de soja, proteínas de avena, saborizante de pescado, syrup, hidróxido de sodio, emulsificante, espesante, etanol, preservante, benzoato denatínium, agua, c.sp.....	100 g

Origen: Estados Unidos

No Inflamable

APARIENCIA: Maxforce® Forte es un cebo de color marrón claro y excelente adherencia que permite una aplicación poco perceptible en todo tipo de superficies.

SEGURIDAD: Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. Dada su especial formulación, Maxforce® Forte posibilita efectuar una aplicación selectiva en todos aquellos lugares donde se requiera una cucarachicida específico.

EFICACIA: La acción letal de Maxforce® Forte comienza de inmediato, produciendo la muerte de las cucarachas a las pocas horas de haberlo ingerido. Maxforce® Forte garantiza el control de cucaracha alemana, manteniendo esta actividad a lo largo de aproximadamente 30 a 60 días post-aplicación dependiendo de la infestación presente.

En aplicaciones de exteriores, la acción del sol directo y el agua reducen la residualidad del gel.

No aplicar gel en áreas donde recientemente se haya aplicado insecticida. No aplicar insecticida sobre el gel ya que actuaría como repelente.

INSTRUCCIONES DE USO: La dosis de Maxforce® Forte a aplicar dependerá del grado de infestación de la plaga. Efectuar un minucioso monitoreo previo de la zona afectada, definiendo los lugares (refugios y lugares de tránsito de las cucarachas) donde aplicaremos los puntos dosis/gotas de gel.

Dosificación recomendada por m² o lineal:

Tipo de cucarachas	Puntos/Dosis de aplicación
Cucaracha alemana (Blatella germanica)	10,1-1,5 g/m²*

*Tamaño de la gota 0,1 g aprox 1-2 mm y 1,5 g aprox. 3 -4 mm

Pequeñas cantidades de gotas del gel bien distribuidas, proveerán un control más rápido de la infestación.

Utilizar las dosis más altas con alta infestación de cucarachas donde el gel compita con fuentes alternativas de alimento para el insecto y en lugares con poco aseo.

Aplicar Maxforce® Forte donde se refugian y/o agrupan las cucarachas, en esquineros, rendijas, grietas, bajo mesadas, cajoneras, alacenas, cocina, heladera, artefactos eléctricos y todo otro lugar donde se pueda observar actividad de las cucarachas. Identificar y controlar los puntos de aplicación a los siete días de aplicado y reponer el cebo consumido. Reaplicar a los 30 a 60 días hasta que se observe que la infestación ha sido controlada. En zonas con alto riesgo de reinfestación conviene mantener el cebado como medida preventiva, revisar los puntos / gotas cada 30 a 60 días.

PRECAUCIONES DE USO: Evitar aplicar Maxforce® Forte en áreas que se lavan en forma rutinaria. No aplicar en áreas de excesiva suciedad/grasitud ya que disminuye la atracción del gel. No aplicar en áreas que han sido pulverizadas recientemente con insecticidas, como así tampoco pulverizar directamente sobre el gel ya que el producto se desactivará. No aplicar aerosoles directos o de descarga total en zonas donde se aplicó. No utilice este producto en o sobre equipos eléctricos donde existe la posibilidad de riesgo de electrocución. En caso de ser necesaria la remoción del gel de los lugares donde ha sido colocado, utilizar una solución de cloruro de sodio al 5% (sal común). El producto puede manchar materiales textiles y prendas de vestir.

El SENASA autoriza el uso del producto para los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de ceberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, huesos y harinas incomedibles, depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

DL 50 oral ratas > 2000 mg/kg
DL 50 dermal ratas > 2000 mg/kg
Iritación de la piel en conejos: leve
Iritación ocular en conejo: mínimo
No sensibilizante dermal

RENDIMIENTO: El contenido de una jeringa de Maxforce® Forte de 30 g es suficiente para tratar un área de 120 m² en infestaciones normales.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si entra en contacto con la ropa o la piel, quitar la ropa contaminada y lavarla en forma separada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de intoxicación concurrir al médico toxicólogo llevando la etiqueta y/o folleto adjunto.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Si está vacío no reutilice la jeringa. Colóquelo en la basura domiciliaria o entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Clase III

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION

Capital Federal: Centro Toxicológico de Hospital de Niños Tel (011) 4962-6666/2247 **Bs. As.:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo Tel (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160; Hospital de Niños La Plata, Tel: (0221) 451-5555/ 0800-222-9911; **Rosario:** Centro Toxicológico TAS –Tel: (0341) 424-2727 / 448-0077, atención las 24 hs, **Córdoba:** Hospital de Urgencias, Tel: (0351) 427-6200 int 4135. **Uruguay:** CIAT Hospital de clínicas 7° piso. Tel.: (02)1722

Argentina

RNPUD N°: 0520085
Autorizado por SENASA: C-
Importador Bayer S.A. RNE: 020033212

Uruguay:

Reg. M.S.P. N°80861
Reg. I.M.M de S.P. N°



Argentina: Bayer S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Munro, Buenos Aires.
Tel: 0800-4444-2822 (CUCA) 011-4762-7000
www.proteccionambiental.com.ar
email: saludambiental@bayercropscience.com

Uruguay: Bayer S.A.

Luis A. de Herrera 1248 WTC Torre III
Unidad 2074/2075
Tel.: (2)192 2300