

HIGIENE PÚBLICA

VERTOX

Bloques

ROJO

RODENTICIDA

Bloques parafinados de 10 g.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Mus musculus "ratón doméstico", *Rattus rattus* "rata de los techos", *Rattus norvegicus* "rata de los caños".

MODO DE EMPLEO:

Debe ser dispuesto de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Realizar una prolija inspección del área infestada y colocar los cebos donde se observen signos de presencia de roedores, como excrementos, manchas grasosas, pelos, pisadas, dentro o en la vecindad de las cuevas y en los sitios de tránsito. Elegir rincones oscuros como caños de agua, objetos, chapas, tablas apoyadas contra paredes, etc.; así como áreas donde se han acumulado residuos, espacios en los techos, paredes huecas, debajo de los pisos y, en particular para ratas que necesitan beber, tener en cuenta las fuentes de agua.

Ratas: 2 a 4 bloques por punto de cebado cada 4 - 9 metros.

Ratones: 2 bloques cada 1 - 2 metros.

Mantener la cantidad de cebo limpio y fresco hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores.

Cuando el cebo no se aplique dentro de madrigueras, disponerlos dentro de tubos o cajas cebaderas que permitan el acceso exclusivo de roedores. El cebo queda protegido de la intemperie y del acceso de animales domésticos y otros animales no blanco.

VERTOX Bloques: contiene un ingrediente activo anticoagulante que mata a los roedores después de 1-2 ingestas. Se aconseja que los cebaderos deberán inspeccionarse cada 2 a 3 días durante la primera semana y luego cada 10 a 20 días de acuerdo al consumo y actividad. Si el consumo no es significativo, deberán ser reemplazados por cebos frescos y revisar la disposición de los mismos.

La inspección de los sitios se realizará hasta que no se observe más actividad.

Se espera que la muerte del roedor se produzca dentro de los 3-4 días de la ingestión del producto y la destrucción de la población en 2-3 semanas dependiendo del área cubierta y del número de roedores existentes.

Al cesar la actividad de los roedores destruir los restos del cebo y los recipientes. Para prevenir nuevas invasiones mantener algunos cebaderos en forma permanente.

COMPOSICIÓN:

Brodifacoum 0.005%

· ATENCIÓN CUIDADO

- ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CUIDADO PELIGROSA SU INHALACIÓN INGESTIÓN Y ABSORCIÓN POR LA PIEL.

USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

